



# เดือนภัยศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอคงเจริญ



ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

## โรแดงมันสำปะหลัง



ลักษณะของใบมันสำปะหลังที่ถูกโรแดงทำลาย



โรแดงมันสำปะหลัง

### การป้องกันกำจัด

๑. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวง่า ตัวง่าปีกสั้น และไรตัวห้า



ตัวง่าสตีออร์สกินโรแดง



ไรตัวห้ากินโรแดง

หมู่ ๒ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

E-mail: dongcharoen.doae.phit@gmail.com โทร ๐๕๖-๙๐๕๔๔๓๗



# เดือนภัยศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอองเจริญ



ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

## ไรแดงมันสำปะหลัง

### การป้องกันกำจัด

๒. หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน

๓. หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบเก็บไปเผาทำลายนอกแปลง

๔. ในแหล่งที่มีการระบาดของรุนแรงเป็นประจำควรใช้สารฆ่าแมลงในการลดความเสียหายดังนี้

๔.๑ อามีทาซ ๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

๔.๒ ไดโคโฟล ๑๘.๕% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

๔.๓ ทีบูเฟนไพเรด (tebufenpyrad) อัตรา ๓-๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือไพริดาเบน (pyridaben) อัตรา ๑๕-๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น ๒ ครั้ง ห่างกัน ๒๐ วัน โดยพ่นครั้งแรกกำจัดได้เฉพาะตัวไรแดง ไม่สามารถกำจัดไข่ไรแดงได้ เว้นระยะไปอีก ๑๐ วัน ให้ไข่ฟักออกเป็นตัวก่อน แล้วฉีดพ่นอีกครั้ง

๔.๔ สไปโรมีซิเฟน อัตรา ๖ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เป็นสารประเภทดูดซึม ฉีดพ่น ๑ ครั้ง สามารถป้องกันมันสำปะหลังจากไรแดงได้นาน ๒ เดือน