



สำนักงานเกษตรอำเภอตงเจริญ

ที่ว่าการอำเภอตงเจริญ อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210 โทร 056-905437


dongcharoen.phichit.doe.go.th



ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แมลงห้ำ

ในช่วงนี้ในหลายพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตัวเต็มวัยแมลงห้ำออกมาเล่นไฟตอนกลางคืนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอแจ้งเตือนเกษตรกรเนื่องจากตัวเต็มวัยสามารถอพยพได้ระยะไกลๆ และสภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาดของแมลงห้ำ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาเพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของ



ลักษณะทั่วไป

แมลงห้ำ เป็นมวนชนิดหนึ่ง มีลักษณะค่อนข้างกลมคล้ายโล่ ด้านหัวและอกเป็นรูปสามเหลี่ยม มีสีน้ำตาลหรือดำ ขอบอาศัยรวมกลุ่มที่โคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนจะเคลื่อนย้ายขึ้นบนต้นข้าว วางไข่เป็นกลุ่ม จำนวน ๒๐-๒๖ ฟองต่อกลุ่ม ที่ใบข้าวหรือกาบใบบริเวณโคนต้นข้าวใกล้ระดับผิวน้ำ โดยฟักตัวอยู่ในร่องระแหงดินในที่ที่มีหญ้าขึ้น เมื่อสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะบินเข้าแปลงนา ทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตแต่มักพบทำลายในช่วงข้าวแตกกอเต็มที่ถึงเก็บเกี่ยว การทำลายในระยะข้าวแตกกอข้าวมีอาการแคะแกร็น มีสีเหลืองหรือเหลืองแกมน้ำตาล ถ้าทำลายหลังระยะข้าวตั้งท้องทำให้ออกรวงไม่สม่ำเสมอและเมล็ดลีบ ต้นข้าวอาจเหี่ยวตายได้ คล้ายข้าวเป็นโรคไหม้กับถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลาย

การป้องกันกำจัด

๑. ใช้กับดักแสงไฟล่อและทำลาย เนื่องจากชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน
๒. กำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้หน้าข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว ทำให้สภาพนาข้าวไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของแมลงห้ำ
๓. ในระยะข้าวแตกกอเต็มที่ถึงเก็บเกี่ยว ถ้าพบแมลงห้ำมากกว่า ๕ ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ ๒๐% อีซี) อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อิติโพรล (เคอร์บิก ๑๐% เอสซี) อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และสารคลอไพโอะนิน (เคนท็อกซ์ ๑๖% เอสจี) อัตรา ๖ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นเฉพาะจุดที่มีการระบาดของ พ่นบริเวณโคนต้นข้าว
๔. พื้นที่ระบาดของแมลงห้ำสามารถปล่อยน้ำเข้านาได้ให้ปล่อยน้ำเข้าท่วมโคนต้นข้าวเพื่อทำให้สภาพนาข้าวไม่เหมาะสมต่อการทำลาย