



เตือนภัยศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอตงเจริญ



อ.ตงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทร 056-905437

ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

โรแดงมันสำปะหลัง

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดพิจิตร เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง กลางวันอากาศร้อน มีลมพัดแรง และฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดการระบาดของโรแดงหรือโรแดงนม ซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของมันสำปะหลัง จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดหากเกิดการระบาดและสร้างความเสียหายแก่ผลผลิต



รูปร่างลักษณะ

โรแดงเป็นแมลงปากดูด อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ตัวเมียขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ตัวอ่อนมี ๓ ระยะ ระยะแรกมี ๖ ขา ตัวกลมใส ระยะที่ ๒-๓ มี ๘ ขา ตัวเต็มมีสีแดงเข้ม อายุประมาณ ๑๕ วัน โรแดงที่เข้าทำลายมันสำปะหลังมี ๒ ชนิด ได้แก่ โรแดงหมอนและโรแดงมันสำปะหลัง

ลักษณะการทำลาย

โรแดงหมอน ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบจากใบล่างและขยายขึ้นส่วนยอด

โรแดงมันสำปะหลัง ดูดกินน้ำเลี้ยงบนหลังใบของส่วนยอดและขยายปริมาณลงสู่ใบล่าง ทำให้ตาลีบ ใบเหลืองซีด ม้วนงอ และร่วง



แนวทางการป้องกันกำจัด

๑. การอนุรักษ์ตัวเต่าและตัวงูปีกสั้น เป็นศัตรูธรรมชาติ
๒. หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง
๓. หมั่นตรวจแปลง หากพบการระบาดรุนแรงในระยะแรก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ อามีทราซ ๒๐ % EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบมันสำปะหลังที่พบการเข้าทำลาย